

Programación lineal

PROGRAMACIÓN LINEAL

PROGRAMACIÓN LINEAL se formula siguiendo el planteamiento general:

$$\min_x z$$

← Función objetivo

s.t.

$$h(x) = 0$$

← Restricciones de igualdad

$$g(x) \leq 0$$

← Restricciones de desigualdad

$$x_{\min} \leq x \leq x_{\max}$$

← Límite variables

PROGRAMACIÓN LINEAL

La formulación se debe expresar como:

$$\min_x z = c^T x$$

← Función objetivo

s.t.

$$A_h x = b_h$$

← Restricciones de igualdad

$$A_g x \geq b_g$$

← Restricciones de desigualdad

$$x_{\min} \leq x \leq x_{\max}$$

← Límite variables

PROGRAMACIÓN LINEAL

Símbolos empleados

a_{ij} = coefficient of variable j (column) in i^{th} constraint equation (row)

A = matrix with elements a_{ij} (termed LHS)

b = vector of constraint RHS values with elements b_i

c_j = objective coefficient for variable j

m = number of constraints

n = number of variables

z = Función objetivo = $\sum c_j x_j$


PROGRAMACIÓN LINEAL

La región factible tiene tres tipos de puntos.

Valor constante de la función objetivo (líneas punteadas)

Punto extremo


Punto interior



Borde, punto frontera


PROGRAMACIÓN LINEAL

Punto extremo: Un punto es extremo si cualquier segmento de la región factible que contiene al punto tiene a éste al final del segmento. También conocido como vértice.




PROGRAMACIÓN LINEAL

El mejor vértice debe ser el valor óptimo de la función objetivo! Si el problema tiene solución óptima ésta debe de estar en un vértice; si tiene múltiples soluciones óptimas al menos dos deben de estar en punto extremos.



PROGRAMACIÓN LINEAL

Es un problema de optimización convexa; luego, ¡un óptimo local es un óptimo global!



OPTIMIZACIÓN NUMÉRICA

Es el único procedimiento (frente a optimización gráfica y analítica) que permite abordar problemas complejos.

*Problema: dificultad en encontrar el **óptimo global** en algunos casos.*

Normalmente sólo conocemos el valor de un punto (x_k y $f(x_k)$) y alguna información local adicional (derivadas,...)

Procedimiento básico de optimización numérica

1. Determinar un *buen siguiente punto* que mejore la función objetivo
2. Comprobar si se puede seguir mejorando. Si se puede volver al punto 1.
3. Parar en un mínimo local.




OPTIMIZACIÓN NUMÉRICA

Optimización numérica empleando información local

A partir del punto inicial, cómo decidimos:


- **La dirección del cambio**
- **La distancia en esa dirección**
- **Si es posible mejorar más**




OPTIMIZACIÓN NUMÉRICA

La ecuación básica:

$$x_{k+1} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}_{k+1} = x_k + \alpha \Delta x_k = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}_k + \alpha \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{bmatrix}_k$$



NUMERICAL OPTIMIZATION



NUMERICAL OPTIMIZATION

- ¿Cómo determinamos α and Δx ?
- ¿Cómo sabemos cuando parar?



$$x_{k+1} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}_{k+1} = x_k + \alpha \Delta x_k = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}_k + \alpha \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{bmatrix}_k$$

Two arrows point from the terms α and Δx_k in the equation to the two boxes below.


- Debe permanecer en la región factible
- No es demasiado grande, hace que la función objetivo pueda disminuir

- Una dirección posible
- Que mejore la función objetivo

PROGRAMACIÓN LINEAL


BASIC NUMERICAL OPTIMIZATION

- We only have local information at the “current” point in an iterative scheme.
- We determine a good next point, which will improve the objective value
- We check if further improvement is possible. If yes, continue
- Stop at local optimum.



PROGRAMACIÓN LINEAL

Basis of the Simplex Algorithm




One approach would

- Consider only adjacent corner points for improvement direction.
- Move along the edge that yields the greatest rate of improvement
- Move until another corner point has been reached
- If further improvement is possible, iterate.

PROGRAMACIÓN LINEAL

The **Simplex algorithm** - Using the Corner Point concept as the foundation for an efficient solution method.

We want to convert this general formulation to a system of linear equations - we know how to solve these!



$$\min_x z = c^T x$$

s.t.

$$A_h x = b_h$$

$$A_1 x \geq b_1$$

$$A_2 x \leq b_2$$

$$x \geq 0$$

PROGRAMACIÓN LINEAL

Standard formulation of LPs

$$\min_x z = c^T x$$

s.t.

$$Ax = b$$

$$x \geq 0$$

How can we formulate the problem...

- If we want to maximize a function?

Use the negative of the same function. *Max f = Min -f*

$$\begin{array}{ll}\min_x z = c^T x \\ s.t. \\ Ax = b \\ x \geq 0\end{array}$$

- If we have unconstrained variables, i.e., **x** may be negative?

x may be written as the difference of **two non-negative** variables, $x = x_1 - x_2$

- If we have inequalities (besides the equalities)?

We can add **non-negative additional (slack) variables** and convert the inequality into a equality.

PROGRAMACIÓN LINEAL

We will add “slack” variables to all inequalities to convert them to equalities.

Original expression

$$5\mathbf{x}_1 + 7\mathbf{x}_2 - 2.3\mathbf{x}_3 \leq 37$$

$$5\mathbf{x}_1 + 7\mathbf{x}_2 - 2.3\mathbf{x}_3 \geq 37$$

$$5\mathbf{x}_1 + 7\mathbf{x}_2 - 2.3\mathbf{x}_3 = 37$$



PROGRAMACIÓN LINEAL

The **Simplex algorithm** - Using the Corner Point concept as the foundation for a solution method.

We have the LP problem in “**Standard Form**”. Note that the system has more variables than equations.

$$\min_x z = c^T x$$

s.t.

$$A x = b$$

$$x \geq 0 \quad [\text{note that ultimately, } x_{\min} \leq x \leq x_{\max}]$$

The vector x of variables now includes the slack variables.

Some definitions...

- **Feasible solution.** A solution that satisfies the constraints
- **Basic solution.** A solution in which $n-m$ variables are set equal to zero, and the remaining systems of equations is solved.
- **Basis.** The collection of variables not set equal to zero to obtain the basic solution
- **Basic feasible solution.** This is a basic solution that satisfies the non-negativity conditions.
- **Nondegenerate basic feasible solution.** This is a basic feasible solution that has got exactly m positive x_i .
- **Optimal solution.** A feasible solution that optimizes the Función objetivo.
- **Optimal basic solution.** This is a basic feasible solution for which the Función objetivo is optimal.

PROGRAMACIÓN LINEAL

The Simplex Algorithm: Finding a solution for “non-square set of equations

$$\begin{array}{cc}
 \text{Basic} & \text{Non-basic} \\
 \left[\begin{array}{ccc} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \dots & & \\ a_{m1} & & a_{mn} \end{array} \right] & \left[\begin{array}{ccc} a_{1,m+1} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m,m+1} & \dots & a_{mn} \end{array} \right] \begin{bmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_m \end{bmatrix}
 \end{array}$$

Original, non-square equation set of constraints in standard form

$$\left[\begin{array}{ccc} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \dots & & \\ a_{m1} & & a_{mn} \end{array} \right] \begin{bmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Square set of equations that can be solved for the basic variables


$$\begin{bmatrix} x_{m+1} \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Non-basic variables which take the values that optimize the objective. The values will be at an extreme of allowed range.

PROGRAMACIÓN LINEAL


FEASIBLE SOLUTION


Any selection of values for the non-basic variables that result in all variables being non-negative yields a feasible solution.




BASIC FEASIBLE SOLUTION

A selection of 0.0 values for the non-basic variables result in basic variables being non-negative and yields a corner point.





(a) feasible cornerpoint



(b) infeasible cornerpoint


PROGRAMACIÓN LINEAL

The Simplex Algorithm

Using the Corner Point concept as the foundation for a solution using the Simplex Algorithm.


Start here

- 1. Are we optimal;**
- 2. Move along an edge to an adjacent corner point.**
- 3. This adds one variable to the basis and removes another variable from the basis.**



PROGRAMACIÓN LINEAL

Moving between adjacent corner points is achieved by changing one variable from basic to non-basic and one non-basic to basic. (The new variables must form a basis.)



The Simplex Algorithm

- Consider only adjacent corner points for improvement direction.
- Move along the edge that yields the greatest rate of improvement
- Move until another corner point has been reached
- If further improvement is possible, iterate.

Algoritmo Simplex: Procedimiento.

$$\begin{array}{ll}\text{Mín:} & f(\underline{x}) = -x_1 + x_2 \\ \text{Sujeto a:} & 2x_1 - x_2 \geq -2 \\ & -x_1 + 3x_2 \geq -2 \\ & -x_1 - x_2 \geq -4 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

Etapla 0. Transformar las restricciones de desigualdad para que **todos los bj sean positivos.**

$$\begin{array}{ll}\text{Mín:} & f(\underline{x}) = -x_1 + x_2 \\ \text{Sujeto a:} & -2x_1 + x_2 \leq 2 \quad (\text{A}) \\ & x_1 - 3x_2 \leq 2 \quad (\text{B}) \\ & x_1 + x_2 \leq 4 \quad (\text{C}) \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

Problema original

Etapla Introducir las **variables de holgura (slack variables).**

$$\begin{array}{ll}\text{Mín:} & f(\underline{x}) = -x_1 + x_2 \\ \text{Sujeto a:} & -2x_1 + x_2 + x_3 = 2 \quad (\text{A}) \\ & x_1 - 3x_2 + x_4 = 2 \quad (\text{B}) \\ & x_1 + x_2 + x_5 = 4 \quad (\text{C}) \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0\end{array}$$

Problema aumentado

¿Grados de libertad?

Etapla 2. Encontrar una *solución* que esté en un vértice de la región *factible*.

2 grados de libertad. 2 variables independientes.

2 variables NO BÁSICAS

3 variables dependientes.

3 variables BÁSICAS

$$\begin{array}{l} x_1=0 \\ x_2=0 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} f(\underline{x}) = 0 \\ x_3 = 2 \quad (A) \\ x_4 = 2 \quad (B) \\ x_5 = 4 \quad (C) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{Mín:} & f(\underline{x}) = -x_1 + x_2 \\ \text{Sujeto a:} & -2x_1 + x_2 + x_3 = 2 \quad (A) \\ & x_1 - 3x_2 + x_4 = 2 \quad (B) \\ & x_1 + x_2 + x_5 = 4 \quad (C) \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{array}$$

Etapla 3. Buscar una *nueva solución factible* que vaya disminuyendo el objetivo.

$$f(\underline{x}) - \sum_i c_i x_i = 0$$

Eliminar como variable no básica la de mayor valor $-c_i$

$$(A) : 2 / -2 = -1$$

$$(B) : 2 / 1 = 2$$

$$(C) : 4 / 1 = 4$$

$$\min \left(\frac{b_j}{a_{jl}} \right) \geq 0$$

Escoger como nueva no básica la de menor valor positivo

(B) x_4 en este caso

Eliminar como variable no básica la de mayor valor -ci

Es la variable que más influye en la función objetivo.

Al pasar a ser básica (distinta de cero) es la que hace disminuir más la función objetivo.

Escoger como nueva no básica la de menor valor positivo

Es la variable que llega antes a una restricción.

$$f(\underline{x}) = 0$$

$$x_3 = 2 \quad (A)$$

$$x_4 = 2 \quad (B)$$

$$x_5 = 4 \quad (C)$$

$$\text{Mín:} \quad f(\underline{x}) = -x_1 + x_2$$

$$\text{Sujeto a:} \quad -2x_1 + x_2 + x_3 = 2 \quad (A) \quad x_1 = 0$$

$$x_1 - 3x_2 + x_4 = 2 \quad (B) \quad x_2 = 0$$

$$x_1 + x_2 + x_5 = 4 \quad (C)$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

Si escojo x_4 (menor valor)
como nueva no básica ($x_4=0$)

$$(B) \quad x_1 = 2$$



$$x_5 = 4 - x_1 = 4 - 2 = 2 \quad x_5 > 0 \text{ OK}$$

Si escojo x_5 (mayor valor)
como nueva no básica ($x_5=0$)

$$(C) \quad x_1 = 4$$



$$x_4 = 2 - x_1 = 2 - 4 = -2 \quad x_4 \text{ NEGATIVA!!}$$

Etapa 4. Transformar las ecuaciones de acuerdo a la nueva distribución de variables.

Variables básicas: x_1, x_3, x_5

Variables no básicas: x_2, x_4

Restricción más desfavorable

$$(B) : x_1 = 2 + 3x_2 - x_4$$



$$(A): -2(2 + 3x_2 - x_4) + x_2 + x_3 = 2 \Rightarrow x_3 - 5x_2 + 2x_4 = 6$$

$$(B): x_1 - 3x_2 + x_4 = 2$$

$$(C): (2 + 3x_2 - x_4) + x_2 + x_5 = 4 \Rightarrow x_5 + 4x_2 - x_4 = 2$$


$$f + (2 + 3x_2 - x_4) - x_2 = 0 \Rightarrow f + 2x_2 - x_4 = -2$$

Se continua el procedimiento hasta....?

Todos los coeficientes de la función objetivo son negativos.

Procedimiento en forma de tabla

		Variables básicas					f= función objetivo	Valores lado derecho
Variables		x1	x2	x3	x4	x5	f	b
x1		1	a12	0	0	a15	0	b1
x3		0	a22	1	0	a25	0	b2
x4		0	a32	0	1	a35	0	b3
		0	-c2	0	0	-c5	1	Valor f



Coeficientes de las ecuaciones de restricción

Coeficientes de la función objetivo

Función objetivo $f = c2 \cdot x2 + c5 \cdot x5$

Las variables básicas NO pueden estar en la función objetivo

Procedimiento en forma de tabla

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	f	b
x_3	-2	1	1	0	0	0	2
x_4	[1]	-3	0	1	0	0	2
x_5	1	1	0	0	1	0	4
	1	-1	0	0	0	1	0

← fila pivote

Mín: $f(\underline{x}) = -x_1 + x_2$

Sujeto a: $-2x_1 + x_2 + x_3 = 2$ (A)

$x_1 - 3x_2 + x_4 = 2$ (B)

$x_1 + x_2 + x_5 = 4$ (C)

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$

columna
pivote

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	f	b
x_3	0	-5	1	2	0	0	6
x_1	1	-3	0	1	0	0	2
x_5	0	4	0	-1	1	0	2
	0	2	0	-1	0	1	-2



	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	f	b
x_3	0	0	1	0.75	1.25	0	8.5
x_1	1	0	0	0.25	0.75	0	3.5
x_2	0	1	0	-0.25	0.25	0	0.5
	0	0	0	-0.5	-0.5	1	-3

$$x_3 = 8.5$$

$$x_1 = 3.5$$

$$x_2 = 0.5$$

Forma canónica

$$\begin{array}{ll}\text{Mín:} & f(\underline{x}) = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \\ \text{Sujeto a:} & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ & \vdots \\ & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \\ & x_i \geq 0 ; b_j \geq 0 \quad (i = 1, n ; j = 1, m)\end{array}$$

Cuando la solución básica factible inicial no es trivial:

Método de las dos fases

Método de la gran M

Método de las dos fases

$$\text{Mín:} \quad f = x_1 + 2x_2$$

$$\text{Sujeto a:} \quad 3x_1 + 4x_2 \geq 5$$

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

Se añaden tantas variables artificiales como sean necesarias para tenerlo en forma canónica, es decir:

$$\text{Mín:} \quad f = x_1 + 2x_2$$

$$\text{Sujeto a:} \quad 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 5 \quad (\text{A})$$

$$x_1 + x_2 + x_4 = 4 \quad (\text{B})$$

$$x_i \geq 0$$

Hay una variable que sólo aparece en una ecuación y tiene coeficiente 1

$$w + \left(\sum_{i=1}^m a_{i1} \right) x_1 + \left(\sum_{i=1}^m a_{i2} \right) x_2 + \dots + \left(\sum_{i=1}^m a_{in} \right) x_n = \sum_{i=1}^m b_i$$

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n + x_{n+1} = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n + x_{n+2} = b_2$$

$$\vdots \quad \ddots \quad \vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n + x_{n+m} = b_m$$

Fase I

Minimizar la suma de las variables artificiales añadidas

Mín: $f = x_1 + 2x_2$

Sujeto a: $3x_1 + 4x_2 - x_3 + x_5 = 5$ (A)

$x_1 + x_2 + x_4 + x_6 = 4$ (B)

$x_i \geq 0$

Como van a ser la base de partida, hay que expresar la función objetivo con el resto de variables.

$w + 4x_1 + 5x_2 - x_3 + x_4 = 9$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	w	b	
3	4	-1	0	1	0	0	5	←
1	1	0	1	0	1	0	4	
4	5	-1	1	0	0	1	9	

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	w	b	
0.75	1	-0.25	0	0.25	0	0	1.25	
0.25	0	0.25	1	-0.25	1	0	2.75	←
0.25	0	0.25	1	-1.25	0	1	2.75	

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	w	b
1	1	0	1	0	1	0	4
1	0	1	4	-1	4	0	11
0	0	0	0	-1	-1	1	0

Fase II

Mín: $f = x_1 + 2x_2$

Sujeto a: $3x_1 + 4x_2 - x_3 = 5$ (A) $x_2 = 4$; $x_3 = 11$.

$x_1 + x_2 + x_4 = 4$ (B)

$x_i \geq 0$

$f = x_1 + 2(4 - x_1 - x_4) \Rightarrow f + x_1 + 2x_4 = 8$

- Se mantiene la tabla de la fase I (sin las variables artificiales)
- Se pone la función objetivo original y si es necesario se transforma para que quede en función de las variables NO básicas

x_1	x_2	x_3	x_4	f	b	
1	1	0	1	0	4	
1	0	1	4	0	11	←
1	0	0	2	1	8	
			↑			

x_1	x_2	x_3	x_4	f	b	
0.75	1	-0.25	0	0	1.25	←
0.25	0	0.25	1	0	2.75	
1	0	-0.5	0	1	2.50	
↑						

	x_1	x_2	x_3	x_4	f	b
x_1	1	1.33	-0.33	0	0	1.67
x_4	0	-0.33	0.33	1	0	2.33
	0	-0.67	-0.33	0	1	1.67

$$x_1 = 1.67 ; x_2 = 0 ; x_3 = 0 ; x_4 = 2.33 ; f = 1.67$$

Resolver mediante el método de las dos fases

Maximize $z = x_1 - 2x_2 - 3x_3 - x_4 - x_5 + 2x_6$
subject to

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 + x_5 = 12$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 + x_6 = 18$$

$$3x_1 + 6x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 = 24$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, 6.$$

FASE 1

Se añaden 3 variables artificiales

$$\text{Minimize } z' = y_1 + y_2 + y_3$$

subject to

$$\left. \begin{array}{rcl} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 + x_5 & + y_1 & = 12 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 + x_6 & + y_2 & = 18 \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 & + y_3 & = 24 \end{array} \right\}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, 6; \quad y_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3$$

$$z' + y_1 + y_2 + y_3 = 0.$$

$$z' + 5x_1 + 10x_2 + 5x_3 + 3x_4 + 6x_5 + x_6 = 54$$

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = 0$$

$$y_1 = 12, \quad y_2 = 18, \quad y_3 = 24$$

Tabla inicial

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	y_1	y_2	y_3	
y_1	1	2	2	1	1	0	1	0	0	12
y_2	1	2	1	1	2	1	0	1	0	18
y_3	3	⑥	2	1	3	0	0	0	1	24
	+5	+10	+5	+3	+6	+1	0	0	0	+54

En este caso escoger la columna del más positivo coeficiente de la función objetivo

$$\min\left\{\frac{12}{2}, \frac{18}{2}, \frac{24}{6}\right\} = \frac{24}{6} = 4,$$

Minimize $z' = y_1 + y_2 + y_3$

subject to

$$\left. \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 + x_5 + y_1 = 12 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 + x_6 + y_2 = 18 \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 + y_3 = 24 \end{array} \right\}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, 6; \quad y_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3$$

↓

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	y_1	y_2	y_3	
← y_1	0	0	$\left(\frac{4}{3}\right)$	$\frac{2}{3}$	0	0	1	0	$-\frac{1}{3}$	4
y_2	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	1	0	1	$-\frac{1}{3}$	10
x_2	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	0	0	0	$\frac{1}{6}$	4
	0	0	$+\frac{5}{3}$	$+\frac{4}{3}$	+1	+1	0	0	$\frac{5}{3}$	+14

↓

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	y_1	y_2	y_3	
x_3	0	0	1	$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{3}{4}$	0	$-\frac{1}{4}$	3
← y_2	0	0	0	$\frac{1}{2}$	1	$\textcircled{1}$	$-\frac{1}{4}$	1	$-\frac{1}{4}$	9
x_2	$\frac{1}{2}$	1	0	0	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	3
	0	0	0	$+\frac{1}{2}$	+1	+1	$\frac{5}{4}$	0	$\frac{5}{4}$	+9

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	y_1	y_2	y_3	
x_3	0	0	1	$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{3}{4}$	0	$-\frac{1}{4}$	3
x_6	0	0	0	$\frac{1}{2}$	1	1	$-\frac{1}{4}$	1	$-\frac{1}{4}$	9
x_2	$\frac{1}{2}$	1	0	0	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	3
	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0

Iteraciones hasta
que la función
objetivo sea cero

$$\begin{aligned}x_3 &= 3 - \frac{1}{2}x_4 \\x_6 &= 9 - \frac{1}{4}x_4 - x_5 \\x_2 &= 3 - \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_5\end{aligned}$$

$$x_2 = 3, \quad x_3 = 3, \quad x_6 = 9$$

$$x_1 = x_4 = x_5 = y_1 = y_2 = y_3 = 0$$

FASE 2

Reescribir función objetivo Maximize $z = x_1 - 2x_2 - 3x_3 - x_4 - x_5 + 2x_6$

$$\text{Max } z = \text{Min } -z = -x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 - 2x_6$$

$$(z' = -z) \text{ Min } z' + x_1 - 2x_2 - 3x_3 - x_4 - x_5 + 2x_6 = 0$$

variables básicas -- $x_2 \ x_3 \ x_6$ --

Tabla resultado de fase I

Función objetivo original

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_3	0	0	1	$\frac{1}{2}$	0	0	3
x_6	0	0	0	$\frac{1}{2}$	1	1	9
x_2	$\frac{1}{2}$	1	0	0	$\frac{1}{2}$	0	3
Función objetivo original	1	-2	-3	-1	-1	+2	0

$f'_4 = f_4 + 2f_3 + 3f_1 - 2f_2$

2	0	0	-1/2	-2	0	-3
---	---	---	------	----	---	----

Función objetivo sólo con variables no básicas (no juegan)
Poner en forma canónica las variables básicas

$$\text{Maximize } z = x_1 - 2x_2 - 3x_3 - x_4 - x_5 + 2x_6$$

$$\begin{aligned} x_3 &= 3 - 1/2x_4 \\ x_6 &= 9 - 1/x_4 - x_5 \\ x_2 &= 3 - 1/2x_1 - 1/2x_5 \end{aligned}$$

Resultado de fase I
(variables básicas -- x_2 x_3 x_6 --
NO pueden aparecer en la
función objetivo)



$$\text{Max } z = x_1 - 2(3 - 1/2x_1 - 1/2x_5) - 3(3 - 1/2x_4) - x_4 - x_5 + 2(9 - 1/x_4 - x_5)$$

$$\text{Max } z = 2x_1 - 1/2x_4 - 2x_5 + 3$$

$$\text{Min } -z + 2x_1 - 1/2x_4 - 2x_5 = -3$$

Función objetivo sólo con variables no básicas (no juegan)

$$\text{Min } -z + 2x_1 - 1/2x_4 - 2x_5 = -3$$

↓

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_3	0	0	1	$\frac{1}{2}$	0	0	3
x_6	0	0	0	$\frac{1}{2}$	1	1	9
← x_2	$\left(\frac{1}{2}\right)$	1	0	0	$\frac{1}{2}$	0	3
	+2	0	0	$-\frac{1}{2}$	-2	0	-3

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_3	0	0	1	$\frac{1}{2}$	0	0	3
x_6	0	0	0	$\frac{1}{2}$	1	1	9
x_1	1	2	0	0	1	0	6
	0	-4	0	$-\frac{1}{2}$	-4	0	-15

Todos negativos, fin del simplex

Maximize $z = x_1 - 2x_2 - 3x_3 - x_4 - x_5 + 2x_6$
subject to

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 + x_5 = 12$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 + x_6 = 18$$

$$3x_1 + 6x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 = 24$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, 6.$$

$$z' = -z = -15 \rightarrow \mathbf{z = 15}$$

$$\mathbf{x_1=6, x_3=3, x_6=9}$$

$$\mathbf{x_2=x_4=x_5=0}$$

Maximizar $8x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 3x_4$

Sujeto a las siguientes restricciones

$$3x_1 - 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 \geq 2$$

$$2x_1 - 3x_2 + x_3 \leq 10$$

$$8x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 \leq 40$$

$$-x_1 + 3x_3 + 3x_4 \geq -10$$

SOLUCIÓN

$$**z = 52**$$

$$**x_2=2, x_3=16 s_1=22, s_4=58**$$

$$**x_1=x_4=s_2=s_3=0**$$

$$\text{Maximizar } 8x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 3x_4$$

Sujeto a las siguientes restricciones

$$3x_1 - 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 \geq 2$$

$$2x_1 - 3x_2 + x_3 \leq 10$$

$$8x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 \leq 40$$

$$-x_1 + 3x_3 + 3x_4 \geq -10$$

$$3x_1 - 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 - s_1 = 2$$

$$2x_1 - 3x_2 + x_3 + s_2 = 10$$

$$8x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 + s_3 = 40$$

$$x_1 - 3x_3 - 3x_4 + s_4 = 10$$

Dado que s_2, s_3, s_4 tienen coeficiente +1 sólo es necesario añadir una variable artificial para tener el sistema canónico que se busca como solución inicial.

$$3x_1 - 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 - s_1 + a_1 = 2$$

$$2x_1 - 3x_2 + x_3 + s_2 = 10$$

$$8x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 + s_3 = 40$$

$$x_1 - 3x_3 - 3x_4 + s_4 = 10$$

Primera fase, minimizar la suma de variables artificiales.

En este caso $\min w = a_1$

Como $a_1 = 2 - 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 - 2x_4 + s_1$, y no puede estar en la función objetivo al ser variable básica, transformo la función objetivo:

$\min w = 2 - 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 - 2x_4 + s_1$, pasando las variables al lado izquierda (para tener el criterio de coger el mayor valor positivo) queda:

$$\min w + 3x_1 - 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 - s_1 = 2$$



Base	x1	x2	x3	x4	s1	s2	s3	s4	a1	b
a1	3	-4	2	2	-1	0	0	0	1	2
s2	2	-3	1	0	0	1	0	0	0	10
s3	8	4	2	1	0	0	1	0	0	40
s4	1	0	-3	-3	0	0	0	1	0	10
f	3	-4	2	2	-1	0	0	0	0	2



Base	x1	x2	x3	x4	s1	s2	s3	s4	a1	b
x1	1	-1,33	0,66	0,66	-0,33	0	0	0	0,33	0,66
s2	0	-0,33	-0,33	-1,33	0,66	1	0	0	0,66	8,66
s3	0	14,66	-3,33	-4,33	2,66	0	1	0	-2,66	34,66
s4	0	1,33	-3,66	-3,66	0,33	0	0	1	-0,33	9,33
f	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0

Todas las variables cero o negativas. Fin del simplex. Lógicamente la función objetivo vale CERO

Fin de la primera fase. Para la segunda fase:

- Se coloca la tabla obtenida la final de la fase I, quitando las columnas de las variables artificiales
- Se pone la función objetivo original
- Se manipula la tabla para tener de nuevo la forma canónica (cero en la función objetivo en las variables básicas)
- Se aplica el método simplex

Maximizar $8x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 3x_4$

Sujeto a las siguientes restricciones

$$3x_1 - 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 \geq 2$$

$$2x_1 - 3x_2 + x_3 \leq 10$$

$$8x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 \leq 40$$

$$-x_1 + 3x_3 + 3x_4 \geq -10$$

$$\text{Max } f = 8x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 3x_4$$

$$\text{Max } f = \text{Min } -f$$

$$\text{Min } -f = -8x_1 - 2x_2 - 3x_3 + 3x_4$$

$$\text{Min } -f + 8x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 3x_4 = 0$$

Base	x1	x2	x3	x4	s1	s2	s3	s4	b
x1	1	-1,33	0,66	0,66	-0,33	0	0	0	0,66
s2	0	-0,33	-0,33	-1,33	0,66	1	0	0	8,66
s3	0	14,66	-3,33	-4,33	2,66	0	1	0	34,66
s4	0	1,33	-3,66	-3,66	0,33	0	0	1	9,33
f	8	2	3	-3	0	0	0	0	0



Base	x1	x2	x3	x4	s1	s2	s3	s4	b
x1	1	-1,33	0,66	0,66	-0,33	0	0	0	0,66
s2	0	-0,33	-0,33	-1,33	0,66	1	0	0	8,66
s3	0	14,66	-3,33	-4,33	2,66	0	1	0	34,66
s4	0	1,33	-3,66	-3,66	0,33	0	0	1	9,33
f	0	12,66	-2,33	-8,33	2,66	0	0	0	-5,33





Base	x1	x2	x3	x4	s1	s2	s3	s4	b
x1	1	0	0,363	0,272	0,090	0	0,090	0	3,8181
s2	0	0	0,409	-1,43	0,727	1	0,022	0	9,4545
x2	0	1	0,227	0,295	0,181	0	0,068	0	2,3636
s4	0	0	-0,36	-3,27	0,090	0	0,090	1	6,1818
f	0	0	0,545	-4,59	0,36	0	-0,86	0	-35,2727



Base	x1	x2	x3	x4	s1	s2	s3	s4	b
x3	2,75	0	1	0,75	-0,25	0	0,25	0	10,5
s2	1,12	0	0	-1,12	0,625	1	0,125	0	13,75
x2	0,62	1	0	-0,12	0,125	0	0,125	0	4,75
s4	9,25	0	0	-0,75	-0,75	0	0,75	1	41,5
f	-1,5	0	0	-5	0,5	0	-1	0	-41

Base	x1	x2	x3	x4	s1	s2	s3	s4	b
x3	3,2	0	1	0,3	0	0,4	0,3	0	16
s1	1,8	0	0	-1,8	1	1,6	0,2	0	22
x2	0,4	1	0	0,099	0	-0,2	0,1	0	2
s4	10,6	0	0	-2,1	0	1,2	0,9	1	58
f	-2,4	0	0	-4,1	0	-0,8	-1,1	0	-52

SOLUCIÓN

$$z = 52$$

$$x_2=2, x_3=16 \quad s_1=22, s_4=58$$

$$x_1=x_4=s_2=s_3=0$$

Maximizar $4x_1 - 2x_2 + 5x_3$

Sujeto a las siguientes restricciones

$$x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 800$$

$$10x_1 + 5x_2 + x_3 \geq 500$$

$$8x_1 - 2x_3 \leq 400$$

$$2x_2 + x_3 = 200$$

SOLUCIÓN

$$\mathbf{z = 1400}$$

$$\mathbf{x_1=100, x_3=200 \ s_1=500, s_2=700}$$

$$\mathbf{x_2=s_3=0}$$

Método de las gran M

Éste método añade variables artificiales, que no deben de aparecer en la solución óptima final

$$P_o = c_1x_1 + \dots + c_nx_n$$

Objetivo original

$$P_a = c_1x_1 + \dots + c_nx_n + Mx_{a1} + \dots + Mx_{am}$$

Objetivo modificado

Las variables artificiales dan una solución inicial en forma canónica.

$$\begin{array}{rcl}
 a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n & +x_{n+1} & = b_1 \\
 a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n & +x_{n+2} & = b_2 \\
 \vdots & \ddots & \vdots \\
 a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n & +x_{n+m} & = b_m
 \end{array}$$

Todas las variables “reales” valen inicialmente 0 y las variables artificiales son las que satisfacen las ecuaciones. Éstas variables tienen de coeficiente 1.

All problem variables initially set to zero

$$\begin{bmatrix}
 a_{11} & \dots & a_{1m} & a_{1,m+1} & \dots & a_{1n} & 1 & \dots & 0 \\
 \dots & & & & & & & 1 & \dots \\
 a_{m1} & & a_{nm} & a_{m,m+1} & \dots & a_{mn} & 0 & \dots & 1
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 x_1 \\
 \dots \\
 x_n \\
 x_{a1} \\
 \dots \\
 x_{am}
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 b_1 \\
 \dots \\
 b_m
 \end{bmatrix}$$

The artificial variables form a basis that ensures a non-singular solution to the equations.

En el óptimo todas las variables artificiales deben de valer 0.

Se consigue poniendo una alta penalización a las mismas en la función objetivo, la “gran M”.

La resolución es en forma de tabla como en los casos anteriores

$$\begin{array}{c}
 \boxed{\text{Coeficientes función objetivo}} \\
 \left[\begin{array}{cccccccccccc}
 -1 & c_1 & c_2 & \dots & 0 & 0 & M & \dots & M \\
 0 & a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & \dots & 1 & 0 & \dots \\
 0 & a_{m1} & a_{mm} & a_{m,m+1} & \dots & a_{mn} & 0 & \dots & 1
 \end{array} \right]
 \begin{bmatrix}
 x_1 \\
 \vdots \\
 x_n \\
 \vdots \\
 x_{am}
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 z \\
 b
 \end{bmatrix}$$

$\boxed{\text{Coeficientes de restricciones LHS}}$
 $\boxed{\text{Variables artificiales}}$
 $\boxed{\text{Coeficientes de restricciones RHS}}$

Ejemplo de resolución empleando el método de la gran M

$$\min \quad z = 2x_1 + 3x_2$$

s.t.

$$0.5x_1 + 0.25x_2 \leq 4$$

$$x_1 + 3x_2 \geq 20$$

$$x_1 + x_2 = 10$$

$$x_i \geq 0 \quad \text{for } i = 1, 2$$

Convertir el problema a estándar añadiendo variables de holgura

$$\min \quad z = 2x_1 + 3x_2$$

s.t.


$$0.5x_1 + 0.25x_2 + s_1 = 4$$

$$x_1 + 3x_2 - s_2 = 20$$

$$x_1 + x_2 = 10$$


$$x_i \geq 0 \quad \text{for } i = 1, 2$$

$$\begin{array}{ll} \min & z = 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} & \\ & 0.5x_1 + 0.25x_2 \leq 4 \\ & x_1 + 3x_2 \geq 20 \\ & x_1 + x_2 = 10 \\ & x_i \geq 0 \quad \text{for } i = 1, 2 \end{array}$$



Añadir variables artificiales para encontrar una solución inicial factible.

$$\begin{array}{ll}
 \min & z = 2x_1 + 3x_2 \\
 \text{s.t.} & \\
 & 0.5x_1 + 0.25x_2 + s_1 = 4 \\
 & x_1 + 3x_2 - s_2 = 20 \\
 & x_1 + x_2 = 10 \\
 & x_i \geq 0 \text{ for } i = 1, 2
 \end{array}$$



$$\begin{array}{ll}
 \min & z = 2x_1 + 3x_2 \\
 \text{s.t.} & \\
 & 0.5x_1 + 0.25x_2 + s_1 = 4 \\
 & x_1 + 3x_2 - s_2 + a_2 = 20 \\
 & x_1 + x_2 + a_3 = 10 \\
 & x_i \geq 0 \text{ for } i = 1, 2
 \end{array}$$

Añadir altas penalizaciones a las variables en la función objetivo.

$$\min \quad z = 2x_1 + 3x_2 + Ma_2 + Ma_3$$

s.t.

$$0.5x_1 + 0.25x_2 + s_1 = 4$$

$$x_1 + 3x_2 - s_2 + a_2 = 20$$

$$x_1 + x_2 + a_3 = 10$$

$$x_i \geq 0 \quad \text{for } i = 1, 2$$

Formular el problema en forma de tabla

!!!NOTA!!! En este caso la función objetivo se ha despejado al revés a lo visto en el método anterior poníamos $(z - 2x_1 - 3x_2 - Ma_2 - Ma_3)$, por eso se escogerá el menor valor negativo en lugar del mayor positivo. ¡Y se acabará cuando todos sean positivos!

$$-z + 2x_1 + 3x_2 + Ma_2 + Ma_3 = 0$$

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 2x_1 + 3x_2 + Ma_2 + Ma_3 \\ \text{s.t.} \quad & 0.5x_1 + 0.25x_2 + s_1 = 4 \\ & x_1 + 3x_2 - s_2 + a_2 = 20 \\ & x_1 + x_2 + a_3 = 10 \\ & x_i \geq 0 \text{ for } i=1,2 \end{aligned}$$

z	x ₁	x ₂	s ₁	s ₂	a ₂	a ₃	rhs	Basic variable	Ratio
-1	2	3	0	0	M	M	0	z	
0	.5	.25	1	0	0	0	4	s ₁	---
0	1	3	0	-1	1	0	20	a ₂	---
0	1	1	0	0	0	1	10	a ₃	---

Canonical form: Buscamos que todas las variables básicas tengan una columna con un 1 y el resto de elementos 0.

Luego operamos para tener esta condición en las variables a₂ y a₃

Ahora el problema está en una solución factible (vértice) y en forma canónica.
Empezamos el procedimiento cambiando una variable de la base (cambiar a un vértice adyacente) para:

1. Mejorar la función objetivo
2. Mantener la solución factible.

Initial tableau

This (x_2) is the variable entering the basis (smallest value < 0).

z	x_1	x_2	s_1	s_2	a_2	a_3	rhs	Basic variable	Ratio
-1	$-2M+2$	$-4M+3$	0	M	0	0	$-30M$	z	
0	.5	-25	1	0	0	0	4	s_1	16
0	1	3	0	-1	1	0	20	a_2	$20/3$
0	1	1	0	0	0	1	10	a_3	10

Pivot element, a_{rs}

This (a_2) is the variable leaving the basis.
(Smallest value of b_i/a_{ij} for entering $a_{ij} > 0$)

Si la solución no es óptima seguimos con el procedimiento.

tableau

This (x_1) is the variable entering the basis (smallest ≤ 0).

Z	x_1	x_2	s_1	s_2	a_2	a_3	rhs	Basic variable	Ratio
-1	$-2M/3+1$	0	0	$-M/3+1$	$+4M/3-1$	0	$-10M/3-20$	z	
0	$5/12$	0	1	$1/12$	$-1/12$	0	$7/3$	s_1	$28/5$
0	$1/3$	1	0	$-1/3$	$1/3$	0	$20/3$	x_2	20
0	$2/3$	0	0	$1/3$	$-1/3$	1	$10/3$	a_3	5

Pivot element, a_{rs}

This (a_3) is the variable leaving the basis.
(Smallest value of b_i/a_{ij} for entering $a_{ij} > 0$)

Third tableau

All reduced costs are greater than 0.0. The objective cannot be decreased by changing the basis, i.e., moving to an adjacent corner point. We have found the *optimum*!

z	x ₁	x ₂	s ₁	s ₂	a ₂	a ₃	rhs	Basic variable	Ratio
-1	0	0	0	1/2	-1/2+M	-3/2+M	-25	z = 25	
0	0	0	1	-1/8	1/8	-5/8	1/4	s ₁ = 1/4	---
0	0	1	0	-1/2	1/2	-1/2	5	x ₂ = 5	---
0	1	0	0	1/2	-1/2	3/2	5	x ₁ = 5	---

10. In this problem, the optimum was reached after the artificial variables were eliminated. Typically, (many) additional corner points would have to be evaluated using the pivoting procedure.

The solution is $x_1 = 5$, $x_2 = 5$; slack variables values are $s_1 = 1/4$ and $s_2 = 0$.
The objective function value is $z = 25$.

PROGRAMACIÓN LINEAL

Problema

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 0.5x_1 + 0.25x_2 \leq 4 \\ & x_1 + 3x_2 \geq 20 \\ & x_1 + x_2 = 10 \\ & x_i \geq 0 \text{ for } i = 1, 2 \end{aligned}$$

Solución

$$z = 25$$

Función
objetivo

$$3.75 \leq 4.0$$

inactive

$$20 \geq 20$$

active

$$10 = 10$$

active

$$x_1 = 5 \geq 0$$

inactive

$$x_2 = 5 \geq 0$$

inactive

variables

¿Puedo saber
algo más con la
solución?



Análisis de sensibilidad

Cómo afecta el cambio de parámetros en la solución.



Problema

$$\min z = 2x_1 + 3x_2$$

s.t.

$$0.5x_1 + 0.25x_2 \leq 4$$

$$x_1 + 3x_2 \geq 20$$

$$x_1 + x_2 = 10$$

$$x_i \geq 0 \text{ for } i = 1, 2$$



Cómo afecta un cambio
en este parámetro en z y
en los valores de x^* ?

¡Sin tener que resolver
de nuevo el problema!

Los coeficientes de la función objetivo de las variables originales se denominan: **costes reducidos**

Los coeficientes de la función objetivo de las demás variables (holgura) se denominan: **precios sombra o duales**

En el **óptimo**:

O la variable es cero (no básica) o el precio dual o el coste reducido es cero.

En el caso de que ambos sean cero:

Existe **solución degenerada** si la variable es básica

Existen **múltiples óptimos** si la variable es no básica

Análisis de sensibilidad

- **Sensibilidad:** Ver la influencia en la función objetivo bien de los valores de la parte derecha de las restricciones (RHS) o bien de los valores de los coeficientes de la función objetivo.

1. Los resultados se limitan a los óptimos **con las mismas restricciones activas** que el caso base, es decir, **no requiere cambiar la base** escogida.
2. Los resultados **definen el rango de cambio** de parámetros (coeficientes función objetivo o constantes de RHS) que implican que no hay cambio en las restricciones activas.
3. El resultado proporciona un valor exacto, cuantitativo de cómo afecta un incremento del parámetro al valor obtenido de la función objetivo.

$$\Delta \text{OBJ}^* / \Delta \text{parametro}$$

Análisis de sensibilidad: Precio Sombra

Cambios en el parámetro parte derecha restricciones (RHS)


El software presenta informes con el **valor y rango** de la sensibilidad de cada restricción. Fuera de ese rango la base cambia.

Constraint ID	Status (Binding/ non-binding) (Active/inactive)	slack	Shadow price (sensitivity of rhs)	Maximum allowable increase (AI)	Maximum allowable decrease (AD)
Max. Reflux flow	Active	0	3.74	47	123
Max. Pump 7	Inactive	321	0	1.0E30	321

Shadow price = $\Delta\text{OBJ}^*/\Delta\text{RHS}$, has units!

Análisis de sensibilidad: Precio Sombra

Cambios en el parámetro RHS



Cuánto puedo cambiar la restricción 1 sin cambiar de base?

Los valores de x^* cambian!
(obsérvese que hasta que la restricción no corta al eje no hay cambio de restricciones activas y por tanto de base).

Los valores de las variables (si la restricción está activa) y de la función objetivo variarán, pero la base permanece.

El nuevo valor de la función objetivo será:

$$Z_{\text{new}} = Z_{\text{original}} - \text{precio sombra} \times \Delta b$$

El software (excel) presenta informes con el **valor y rango** de la sensibilidad de cada restricción. Fuera de ese rango la base cambia.

Constraint ID	Status (Binding/ non-binding) (Active/inactive)	slack	Shadow price (sensitivity of rhs)	Maximum allowable increase (AI)	Maximum allowable decrease (AD)
Max. Reflux flow	Active	0	3.74	47	123
Max. Pump 7	Inactive	321	0	1.0E30	321

La variable vale 0 y su precio sombra distinto de cero, aquí 3,74.


Un incremento de la restricción activa de 10 unidades implicaría un incremento en la función objetivo de $3,74 \times 10 = 37,4$ unidades.

Siempre que no aumente el valor de la restricción en más de 47 unidades o lo baje en más de 123 unidades las variables básicas (distintas de cero) seguirán siendo las mismas.

Análisis de sensibilidad

$$\text{Función objetivo} = z = \sum c_j x_j$$

Sensibilidad a un cambio en un coeficiente de la función objetivo.



Original problem

Cambios en c_j que no cambian la base,

$$\Delta x = 0$$

$$\Delta z = \Delta \sum c_j x_j = \sum \Delta c_j (x_j)$$

$$= \Delta c_k (x_k)$$

Donde k = el coeficiente cambiado

Los valores de *las variables en el nuevo óptimo no cambian*, al no variar las restricciones y no cambiar la base. Luego el óptimo es el mismo punto en el espacio.

El nuevo valor objetivo se calcula poniendo los valores de las variables en la nueva función objetivo, dado que cada vez se varía un coeficiente se puede calcular el cambio en la función objetivo debido a un cambio en el coeficiente. Hay dos casos:

Cambio los coeficientes (c) de las variables básicas de la función objetivo, en este caso la función objetivo variará según $c^(x_{\text{new}} - x_{\text{old}})$
Nótese que en este caso el gradiente reducido es CERO (a no ser que la variable básica esté en una restricción)

*Cambio en los coeficientes (c) de las variables no básicas de la función objetivo, en este caso la función objetivo NO variará, al ser las variables igual a cero.

Nótese que en este caso el gradiente reducido es DISTINTO de CERO

No olvidar que esto es válido siempre que variemos los valores de los coeficientes dentro del rango proporcionado por el informe de sensibilidad.

El Gradiente o coste reducido.

VARIABLE BÁSICA (distinta de cero)

- *No está en una restricción → Coste reducido CERO*
- *Sí está en una restricción → Coste reducido DISTINTO de CERO (va a favor de la función objetivo, es decir, si se está maximizando será positivo y si se está minimizando será negativo)*

VARIABLE NO BÁSICA (igual a cero)

- Coste reducido DISTINTO de CERO. Siempre VA en CONTRA de la función objetivo, es decir, si se está maximizando será negativo y si se está minimizando será positivo.

El Gradiente o coste reducido: interpretación.

Se puede interpretar de dos formas:

1) el cambio que se tiene que hacer en el coeficiente de la función objetivo de la variable NO BÁSICA correspondiente para que esta pase a ser básica, es decir, distinto de cero.

Por ejemplo, en una fábrica se obtiene como resultado al maximizar el beneficio que se debe fabricar los productos A y B pero no C. El coste reducido asociado a C es de -2, esto significa que si consigo aumentar el margen de beneficio en C en más de 2 unidades, en el nuevo óptimo C será distinto de cero.

2) La penalización que sufro en mi función objetivo si por cualquier motivo me obligan a producir C. Por cada unidad de C que me obliguen a producir perder el coste reducido (en este caso 2 unidades) en mi función objetivo.

Nótese que el valor debe coincidir con uno de los límites de variación de los coeficientes, ya que estos indican cuando hay cambio de base en la solución.

Ejemplo

Si tenemos una variable que vale CERO (no básica) y su coste reducido es ,por ejemplo, 8. Observando el informe de sensibilidad se ve que coincide con el límite de decremento del coeficiente de la función objetivo, entonces tenemos que si variamos en algo más de **8 unidades**, por ejemplo **10**, este coeficiente (que supongamos que es 100) y EJECUTAMOS de nuevo la optimización tendremos como resultado un valor de la variable DISTINTO de CERO (supongamos 7) y a la función objetivo le habrá afectado en $7 \cdot (10 - 8) = 14$ unidades (mejorando la función objetivo dado que hemos variado lo suficiente el coeficiente para que dicha variable vaya a favor de la función objetivo).

Sólo le empieza a afectar una vez pasado el umbral de 8, de ahí que sea 10-8.

Celdas cambiantes

Celda	Nombre	Valor Igual	Gradiente reducido	Coefficiente objetivo	Aumento permisible	Aumento permisible
\$D\$19	A1C1	0,8	0	65	5	10
\$E\$19	A1C2	0	5	100	1,00E+30	5
\$F\$19	A1C3	0,3	0	115	15	115
\$G\$19	A2C1	0,1	0	55	10	5
\$H\$19	A2C2	0,7	0	85	5	95
\$I\$19	A2C3	0	15	120	1,00E+30	15

Restricciones

Celda	Nombre	Valor Igual	Sombra precio	Restricción lado derecho	Aumento permisible	Aumento permisible
\$D\$12	A1 C1	1,1	0	1.6	1,00E+30	0.5
\$D\$13	A2 C1	0,8	-10	0.8	0.8	0.1
\$D\$14	C1 C1	0,9	65	0.9	0.5	0.8
\$D\$15	C2 C1	0,7	95	0.7	0.1	0.7
\$D\$16	C3 C1	0,3	115	0.3	0.5	0.3

Si el coeficiente objetivo hago que valga 90 en lugar de 100 y como resultado obtengo que A1C2 vale 0,7 entonces la función objetivo habrá variado por esta razón en $0,7 \cdot (10 - 5) = 3,5$ unidades.

Análisis de sensibilidad

$$\min_x z = c^T x$$

s.t.

$$A x = b$$

En general cambios en los coeficiente “A” del LHS, implican que el problema se debe resolver de nuevo.

$$x_{\min} \leq x \leq x_{\max}$$

Animación análisis

sensibilidad

PROGRAMACIÓN LINEAL


The LP Simplex Algorithm **Weird Events**

We must monitor and diagnose the LP solution. We could have made a formulation error, or we could have defined a problem that is correct but has special, unusual, properties.

We must monitor for **weird effects.**

Let's learn to

- diagnose and
- correct (if possible).




Original problem

PROGRAMACIÓN LINEAL

The LP Simplex Algorithm **Weird Events**

NO FEASIBLE SOLUTION

- **Diagnosis -**
- **Remedial Action -**




PROGRAMACIÓN LINEAL

The LP Simplex Algorithm **Weird Events**

NO FEASIBLE SOLUTION

- **Diagnosis** - At least one artificial variable in optimal basis - software reports this as infeasible.
- **Remedial Action** - reformulate, if appropriate

(See goal programming)




PROGRAMACIÓN LINEAL

The LP Simplex Algorithm **Weird Events**

UNBOUNDED SOLUTION

- **Diagnosis -**
- **Remedial Action -**




PROGRAMACIÓN LINEAL

The LP Simplex Algorithm **Weird Events**

UNBOUNDED SOLUTION

- **Diagnosis** - The distance to the best adjacent corner point is infinity - software will report.
- **Remedial Action** - Reformulate, which is always possible - realistic variables never go to ∞




PROGRAMACIÓN LINEAL

The LP Simplex Algorithm **Weird Events**

ALTERNATIVE OPTIMA

- **Diagnosis -**
- **Remedial Action -**



PROGRAMACIÓN LINEAL


The LP Simplex Algorithm **Weird Events**

ALTERNATIVE OPTIMA

- **Diagnosis 1 - The basis can change with no change in objective.**

One or more non-basic variables has a zero marginal cost.

Software does not report warning



PROGRAMACIÓN LINEAL


The LP Simplex Algorithm **Weird Events**

ALTERNATIVE OPTIMA

- **Diagnosis 2 - One or more active constraint rhs can be changed without affecting the objective.**

An active constraint has a zero marginal value and non-zero range (both ways).

Software does not report warning




PROGRAMACIÓN LINEAL

The LP Simplex Algorithm **Weird Events**

ALTERNATIVE OPTIMA

- **Remedial action-** We have found the best value of the Función objetivo!

We likely prefer one of the different sets of x values. We would like to know all solutions and select the “best”, using additional criteria.




PROGRAMACIÓN LINEAL

The LP Simplex Algorithm **Weird Events**

CONSTRAINT

DEGENERACY: Redundancy

- **Diagnosis -**
- **Remedial Action -**



PROGRAMACIÓN LINEAL

The LP Simplex Algorithm **Weird Events**


CONSTRAINT

DEGENERACY: Redundancy

- Remedial action- The solution is correct.

The sensitivity information is not reliable!

If you need sensitivity information, introduce the change (rhs, cost, etc.) and rerun the optimization.




PROGRAMACIÓN LINEAL

The LP Simplex Algorithm **Weird Events**

CONSTRAINT

DEGENERACY:

- **Diagnosis -**
- **Remedial Action -**



PROGRAMACIÓN LINEAL


The LP Simplex Algorithm **Weird Events**

CONSTRAINT

DEGENERACY:

- **Diagnosis -**
More inequalities are active (slacks = 0) than dimension of the problem.

Software does not report warning



PROGRAMACIÓN LINEAL

The LP Simplex Algorithm **Weird Events**

CONSTRAINT

DEGENERACY:

- Remedial action - The solution is correct.

The sensitivity information is not reliable!

If you need sensitivity information, introduce the change (rhs, cost, etc.) and rerun the optimization.

